

BIODIVERSITAT DEL CORREDOR D'AIGUAMOLLS DE LA BADIA D'ALCÚDIA MARISTANY I ESTANY DES PONTS



Ajuntament
d'Alcúdia



Universitat
de les Illes Balears



RESTAURALCÚDIA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fundación Biodiversidad



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



RESTAUR**ALCÚDIA**

El projecte RestaurAlcúdia cerca recuperar les zones humides urbanes de Maristany i l'Estany des Ponts, a Alcúdia, degradats pels abocaments i l'ocupació urbana. Aquestes zones, essencials per a la biodiversitat i la prevenció d'inundacions, estan protegides per normatives europees i locals. Les accions a desenvolupar inclouen la creació d'àrees inundables, eliminació d'espècies invasores, retirada de runes i el foment de la participació ciutadana. Les zones humides, abans considerades insalubres, són clau per la seva aportació d'aigua, biodiversitat, control d'inundacions i mitigació del canvi climàtic. Aquest projecte lidera l'esforç per restaurar ecosistemes perduts i mostra el valor de la col·laboració entre la societat, l'economia i les administracions.

MÉS INFORMACIÓ

wwf.es/restauralcudia

El Projecte RestaurAlcúdia (2023-2025) compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.



COM ACOSTAR-TE A LA NATURA



Gaudeix de la natura sense molestar la fauna i respectant la flora.

Respecta els cartells i les normes dels espais protegits.



Porta a la motxilla uns prismàtics, aigua i alguns aliments, com fruits secs.



Evita els renous, moviments bruscos i colors cridaners, ja que espanten la fauna.

Camina pels senders i no agafis flors, branques, bolets o fruits.

Evita moure pedres i no facis munts amb elles, són refugi d'amfibis, rèptils i invertebrats i els posaràs en perill.



Avança a poc a poc i para atenció a petjades o cants per a detectar la fauna més esquiva.

L'època de cria de les aus és entre març i juliol, i és quan són més vulnerables. No t'acostis als nius.



Emporta't els fems amb tu i diposital's després en un lloc adequat, no els deixis a la natura.



PUNTS D'OBSERVACIÓ RECOMANATS

MARISTANY



ESTANY DES PONTS



Els itineraris recomanats són els disponibles en 2025. Una vegada posat en marxa el pla d'ús públic, es preveu que hi hagi itineraris senyalitzats, probablement lleugerament diferents.



ÍNDEX DE ESPÈCIES

AUS

ELS HABITANTS AMB PLOMES

Siulador
Griseta
Collblau
Moretó capvermell
Becvermell
Setmesó
Soterí gros
Fotja
Polla d'aigua
Agró blanc
Agró blau
Orval
Gavina
Picaplatges petit
Picaplatges camanegre
Xivitona
Avisador
Àguila peixatera
Arpella
Xoriguer
Rossinyol bord
Buscarla de canyar
Busqueret capnegre
Rossinyol
Xàtxero
Arner

MAMÍFERS TERRESTRES

LA FAUNA DISCRETA

Eriçó
Conill
Ratapinyada petita comuna
Ratapinyada petita de vores clares

AMFIBIS I RÈPTILS

SUPERVIVENTS DEL PASSAT

Calàpet
Granota
Drag
Serp d'aigua

INVERTEBRATS

ELS GRANS OBLIDATS

Papallones diürnes
Papallones nocturnes i arnes
Libèl·lules i cavallets del dimoni
Escarabats aquàtics
Aranyes tigre
Llagost d'albufera

Xinxà d'aigua
Caragolets aquàtics
Escopinya de gallet
Cloïssa fina
Puça de mar
Anemone de mar marró i anemone comuna
Briozous
Cuc incrustant elegant
Ctenòfors

PEIXOS

ELS VERTEBRATS SUBMERGITS

Anguila
Llop
Orada
Círvia
Agulleta de riu
Mújol
Moixó
Cabot de fang

FLORA

LA VEGETACIÓ QUE CREA EL PAISATGE

Canyet
Mansega
Créixens
Volantí espigat
Bova
Llapó negre
Tamarell
Jonc marí
Cirialera
Verdolaga marina
Algueró
Saladines
Mosques blaves
Orella de llebre

ESPÈCIES EXÒTIQUES

FORASTERES INVASORES

Cranc de riu americà
Cranc blau
Mercierella
Moix
Bàlsam
Gram
Sempreverd
Figuera de moro

AUS

ELS HABITANTS AMB PLOMES



SIULADOR

(*Mareca penelope*)

Hivernant. Neda en zones poc profundes amb vegetació propera. Tots dos sexes tenen una gran taca blanca sobre cada ala que s'observa durant el vol.




GRISETA

(*Mareca strepera*)

Hivernant, encara que cada vegada hi ha més exemplars que es queden tot l'any. Durant la primavera, es poden veure en aigües tranquil·les, a l'hivern també en maresmes i desembocadures de torrents.






COLLBLAU

(*Anas platyrhynchos*)

Resident. És tal vegada l'ànnera més coneguda. Pot veure's en tota mena d'ambients aquàtics. És l'antecessor de l'ànnera domèstic.



MORETÓ CAPVERMELL

(*Aythya ferina*)

Hivernant. És un ànnera bussejadora que es pot observar sovint en petits grups. Neda amb la part posterior lleugerament submergida.



BECVERMELL

(*Netta rufina*)

Resident, amb arribada d'exemplars hivernants. Ànnera bussejadora. Durant el vol destaca una franja blanca sobre la part anterior de cada ala. Viu tant en aigua dolça com salobre.



SETMESÓ

(*Tachybaptus ruficollis*)

Resident. És de petita mida i aspecte compacte. Se submergeix ràpidament per a bussejar diversos metres emergint de nou en un altre punt. El niu consisteix en una plataforma flotant de branquetes ancorada al fons.





SOTERÍ GROS *(Podiceps cristatus)*

Resident. A partir de la primavera, tots dos sexes canvien a una coloració més atractiva amb uns característics grups de plomes en les galtes. S'alimenta de petits peixos i invertebrats aquàtics que captura submergint-se.



FOTJA *(Fulica atra)*

A la població resident, s'hi afegeixen els hivernants. Associada a l'aigua dolça. Abans d'emprendre el vol, recorre diversos metres xipollejant sobre la superfície de l'aigua.



POLLA D'AIGUA (*Gallinula chloropus*)

Resident. Molt esquiva, s'amaga entre la vegetació. Molt estesa en albuferes, en estanys i torrents. Pot criar fins a tres vegades a l'any.



AGRÓ BLANC (*Egretta garzetta*)

Resident. Vola amb el coll encongint en forma de S i les potes dirigides cap enrere. Es desplaça lentament en aigües someres per a capturar petits peixos i altres preses.



AGRÓ BLAU

(Ardea cinerea)

Present a l'hivern i primavera, no cria a Balears. És la més gran de les garses europees. S'alimenta de peixos i insectes, i també de petits vertebrats.



ORVAL

(Nycticorax nycticorax)

Resident amb arribada d'hivernants.

D'hàbits crepusculars i nocturns. S'alimenta de peixos i amfibis que caça a l'aguait en la vorera. Els joves presenten una coloració clapejada de marró i gris.



GAVINA

(Larus michahellis)

Resident. Molt comú, fins i tot a les ciutats. Cria en illots i penya-segats, formant colònies que defensa amb agressivitat. Té una dieta molt variada, sent oportunista.



PICAPLATGES PETIT

(Charadrius dubius)

Resident. Es desplaça ràpidament corrent o volant baix. Viu en voreres de platges i torrents alimentant-se de petits invertebrats. Construeix un niu simple sobre el sòl.




PICAPLATGES CAMANEGRE

(Charadrius alexandrinus)

Resident. Viu en el litoral arenós.

Construeix el niu acumulant petxines i pedres. Per a defensar-lo davant un depredador, simula estar ferit deixant caure una ala i allunyant-se del niu.




XIVITONA

(Actitis hypoleucos)

Hivernant. S'alimenta de petits invertebrats que captura entre el llim o en la superfície de l'aigua.






AVISADOR

(Himantopus himantopus)

És estival, cria a Balears. Davant una possible amenaça emet crits. Captura petits invertebrats en l'aigua o el llim. El niu és una depressió coberta de vegetació.



ÀGUILA PEIXATERA

(Pandion haliaetus)


Resident. Captura peixos llançant-se des de l'aire. Es pot observar tant en la mar com en embassaments i albuferes. Fa el niu en penya-segats costaners. Construeix grans nius de branques.



ARPELLA

(*Circus aeruginosus*)

Resident. És un rapinyaire típic d'albuferes i llacunes que sobrevola planejant amb les ales en posició de V. Les seves potes llargues li permeten capturar cries d'altres ocells entre la vegetació palustre.



XORIGUER

(*Falco tinnunculus*)


Resident. Cerca les seves preses suspès en l'aire amb la cua en ventall, inspeccionant el terreny. S'alimenta de petits vertebrats i insectes.



ROSSINYOL BORD

(Cettia cetti)

Resident. Difícil de veure, però molt audible pel seu cant potent. S'alimenta d'insectes. El mascle construeix el niu a baixa altura entre la vegetació densa.



BUSCARLA DE CANYAR

(Acrocephalus scirpaceus)

Estival. Viu entre el canyís, joncs o canyes, és més fàcil escoltar-lo que veure'l. Dieta basada en insectes i altres petits invertebrats.






BUSQUERET CAPNEGRE

(*Curruca melanocephala*)


Resident. S'observa en arbustos, realitzant vols curts. S'alimenta de petits insectes, afegint fruits a la tardor i hivern. Un dels aucells més comuns, fins i tot en zones urbanes.



ROSSINYOL

(*Luscinia megarhynchos*)

Estival. El seu potent cant, que també emet de nit, és molt melodiós. S'alimenta d'insectes que captura tant en vol com entre la vegetació o en el sòl.



XÀTXERO

(Motacilla alba)

Hivernant. Sent predilecció per zones entollades i vores de camins, movent la seva llarga cua a dalt i a baix. S'alimenta picotejant petits insectes en terra. Passa la nit en dormidors comunitaris.



ARNER

(Alcedo atthis)

Hivernant. Petit ocell que s'alimenta de peixos, capgrossos i larves d'insectes que captura en l'aigua, llançant-se com un projectil de color blau elèctric.

MAMÍFERS TERRESTRES

LA FAUNA DISCRETA

ERIÇÓ


(Atelerix algirus)



Única espècie d'eriçó que viu a Balears. En sentir-se amenaçat, s'encongeix convertint-se en una bolla d'espines. La seva activitat és principalment nocturna. S'alimenta d'insectes, caragols, fruits i carronya.

CONILL

(Oryctolagus cuniculus)



Animal fugisser, que es desplaça a petits salts o a la carrera quan fuig. Construeix caus. S'alimenta de vegetals i fruits. És crepuscular i nocturn.





RATAPINYADA PETITA COMUNA

(Pipistrellus pipistrellus)

Uns de les ratapinyades més comunes. Vola ràpidament fent canvis bruscos de direcció. Es refugia en fissures, tant de teulades com en troncs d'arbre. S'alimenta de mosquits, petites arnes i altres insectes que captura al vol.



RATAPINYADA PETITA DE VORES CLARES

(Pipistrellus kuhlii)

Semblant a la ratapinyada petita comuna de la qual es diferencia per petits detalls només visibles de prop. És també un excel·lent insectívor, i ha après a caçar els insectes atrets pels fanals.




AMFIBIS I RÈPTILS

SUPERVIVENTS DEL PASSAT



 **CALÀPET**
(*Bufo balearicus*)


Els mascles, de menor mida, emeten un cant vibratori agut que recorda al d'un insecte. Surt de nit per a alimentar-se. Només se submergeix en l'aigua per a aparellar-se, produint llargs cordons gelatinosos amb els ous fecundats.



 **GRANOTA**
(*Pelophylax perezi*)

Es troba en qualsevol zona amb aigua, torrent o estany. Bona nedadora. La seva coloració va del verd al marró, amb o sense taques dorsals. El característic cant del mascle s'escolta llarga distància.





DRAGÓ

(Tarentola mauritanica)

La seva coloració canvia segons la superfície sobre la qual es troba. Viu en orificis de les roques, baix pedres i troncs, activant-se a la nit per a caçar insectes. Durant el dia pren el sol, però escapa ràpidament quan nota la nostra presència.



SERP D'AIGUA

(Natrix maura)

Serp adaptada al medi aquàtic. Neda amb rapidesa ondulant el seu cos. Depreda peixos i granotes. Descansa fora de l'aigua, en la vorera. És totalment inofensiva.



INVERTEBRATS

ELS GRANS OBLIDATS




PAPALLONES DIÛRNES

(lepidòpters ropalòcers)

Sobrevolant la vegetació i libant sobre flors, podem observar diverses espècies de papallones com la **papallona del gram** (*Pararge aegeria*), la **papallona rei** (*Papilio machaon*), la **migradora dels cards** (*Vanessa cardui*), la **papallona llimonera** (*Gonepteryx cleopatra*), la **blanqueta de la col** (*Pieris rapae*), o la petita però bella **blaveta comuna africana** (*Polyommatus celina*).





PAPALLONES NOCTURNES I ARNES

(lepidòpters heteròcers)

Malgrat la seva denominació com a “nocturnes”, al no ser papallones pròpiament dites, moltes d’elles tenen hàbits diürns, com el **borino ros** (*Macroglossum stellatarum*), l’**arna plusia** (*Autographa gamma*) o la **colometa arlequí** (*Utetheisa pulchella*). Les seves respectives erugues viuen en determinades plantes nutrícies.





LIBÈL·LULES I CAVALLETS DEL DIMONI


(odonats)

Sobrevolant la superfície de l'aigua o romanent a l'aguait sobre la vegetació destaquen la **libèl·lula blava** (*Anax imperator*), la **libèl·lula fletxa vermella** (*Sympetrum striolatum*) i la **libèl·lula vermella** (*Crocothemis erythraea*). Més delicat i de mida molt menor és el **cavallet del dimoni blau** (*Ishnura elegans*) que deambula entre la vegetació.



ESCARABATS AQUÀTICS


En la superfície de l'aigua, els escarabats *Gyrinus* es desplacen ràpidament en grup. Mentrestant, surten a la superfície uns altres que necessiten agafar aire per a submergir-se de nou. Hi ha espècies depredadores i altres vegetarianes.



ARANYES TIGRE

(*Argiope trifasciata* y *A. bruennichi*)


Teixeixen una gran i resistent tela. Els exemplars que es veuen són femelles, mentre que els mascles són diminuts i normalment es troben amagats en els racons de la teranyina. Són inofensives.



LLAGOST D'ALBUFERA

(Tropidopola cylindrica)

Confia en el seu mimetisme. Si se sent amenaçat mostra una coloració vermellosa en la part interior de cada fèmur.




XINXA D'AIGUA

(Notonecta maculata)

Comú en tota mena d'embassaments, estanys i canals d'albufera. Absorbeix fluids d'altres insectes sobre els quals depreda. Neda d'esquena.





CARAGOLETS AQUÀTICS

Hi ha de dos tipus, els que respiren per brànquies i els terrestres adaptats al mitjà aquàtic que viuen submergits. Alguns arriben a ser una plaga. S'alimenten d'algues i plantes.



ESCOPINYA DE GALLET

(Cerastoderma glaucum)

Bivalve típic del litoral arenós, que viu enterrat alimentant-se per filtració. Les seves valves tenen ràdios molt marcats amb costelles convexes.






CLOÏSSA FINA

(*Ruditapes decussatus*)

La seva coloració és molt variable, amb bandes i línies. Viu enterrada excavant galeries. Es troba en el litoral arenós i en fons de maresmes.




PUÇA DE MAR

(*Talitrus saltator*)

Es troba entre les restes de posidònia i sorra acumulats en la vorera. Es desplaça mitjançant salts. S'alimenta d'algues. En pujar el nivell de la mar colonitza zones interiors.





ANEMONE DE MAR MARRÓ I ANEMONE COMUNA

(*Aiptasia diaphna* / *Bunodeopsis strumosa*)

L'anemone de mar marró viu adherida sobre el substrat formant colònies en fons somers. La comuna, que és més petita, viu sobre plantes i algues enterrant-se en el fons durant l'hivern.



BRIOZOUS

(*Zoobotyron verticillatum*)


Forma grans colònies creant una estructura en forma d'arbust que serveix com a refugi per a molts altres organismes. D'aigües poc profundes, sobre substrats durs i objectes flotants. S'alimenta filtrant plàncton.



CUC INCRUSTANT ELEGANT

(Hydroides elegans)

El cuc és ataronjat, viu dins d'un tub calcari blanc i trencadís. Forma colònies sobre substrats durs. Viu en aigües sores suportant altes temperatures i contaminació.




CTENÒFORS

Espècies marines de textura gelatinosa, translúcides i amb bioluminescència. S'alimenten de plàncton. Els corrents les transporten a la vorera arribant a entrar en aigües salobres.

PEIXOS


ELS VERTEBRATS SUBMERGITS



ANGUILA

(Anguilla anguilla)

Forma de serp. Neix en la mar dels Sargassos, a l'Atlàntic. Arriba a les nostres aigües en forma d'angula que entra en albuferes, torrents i maresmes per a alimentar-se d'insectes, cucs i altres peixos. Per a reproduir-se torna al lloc on va néixer.




LLOP

(Dicentrarchus labrax)

Emparentat amb l'anfós. Depreda crustacis, cucs i altres peixos. Els juvenils solen anar en grup en aigües somes o prop de la vorera.






ORADA

(*Sparus aurata*)

Habita fons litorals, especialment arenosos, entrant en albuferes i maresmes. Amb la seva dura dentadura trenca les petxines de mol·luscos.



CÍRVIA

(*Seriola dumerili*)

Peix depredador que arriba a grans dimensions. Els juvenils entren en maresmes i albuferes per a devorar a altres peixos.






AGULLETA DE RIU

(Syngnathus abaster)

Emparentada amb els cavallets de mar.
Viu entre la vegetació a poca profunditat.



MÚJOL

(Mugil cephalus)

Peix típic de zones portuàries i maresmes, que entra en albuferes a través de canals i tolera aigües una mica dolces. Sol nedar en grups.





MOIXÓ

(Atherina boyeri)

Es desplaça en grups, prop de la superfície, essent presa habitual dels peixos depredadors.



CABOT DE FANG

(Gobius niger)

És el gòbid de major mida de la Mediterrània. Sol reposar en fons poc profunds, amagant-se ràpidament en orificis i esquerdes.



FLORA

LA VEGETACIÓ QUE CREA EL PAISATGE



CANYET

(Phragmites australis)

Pot arribar als 3 metres d'altura, coronat per una gran inflorescència on hi ha les flors amb forma d'espigues. Molt característic del paisatge dels aiguamolls.



MANSEGA

(Cladium mariscus)

Planta típica d'albuferes on pot arribar a cobrir grans extensions. La tija no és de secció cilíndrica, sinó triangular. Les espigues són de petita mida.





CRÉIXENS

(Nasturtium officinale)

Viu dins de l'aigua formant una massa de tiges i fulles. La floració és allargada amb diminutes flors blanques.

VOLANTÍ ESPIGAT

(Myriophyllum spicatum)

Viu submergida tant en aigües dolces com salobres. Les fulles tenen forma de plomissol i envolten la tija. Les flors, que semblen espigues, emergeixen a la superfície.





BOVA

(Typha domingensis)

Típica planta d'aiguamolls amb les fulles molt llargues i estretes i la seva característica floració en forma de cigar.



LLAPÓ NEGRE

(Potamogeton pectinatus)

Planta aquàtica d'aspecte filamentós. Forma espesses masses. Moltes espècies d'insectes i la granota comuna es refugien en ella o la usen com a plataforma per al descans.



TAMARELL (*Tamarix spp.*)

Arbre típic de zones litorals i salobres amb fulles primes, ondulades i molt juntes entre elles. Flor en forma de raïms.



JONC MARÍ (*Juncus acutus*)

Les seves fulles i tiges són punxants. La inflorescència, situada en les parts més altes de la planta, és reconeix pel seu color marró i els fruits en forma de càpsula. Molt estès en els aiguamolls de les Balears.






CIRIALERA

(Sarcocornia fruticosa)


Forma gran part de la massa vegetal en maresmes i aigües salobres. Les tiges joves són erectes, amb nusos i tenen una textura carnososa que es torna vermellosa. Reté aigua salina en els seus teixits.




VERDOLAGA MARINA

(Halimione portulacoides)

És un arbust que viu en el litoral i zones salobres. La seva forma és ramificada amb la base llenyosa i fulles de color verd clar una mica grisenc.





ALGUERÓ

(Cymodocea nodosa)

Planta herbàcia subaquàtica. Viu en aigües salobres o marines poc profundes, on forma grans praderies submergides idònies com a refugi per a molta fauna aquàtica.



SALADINES


(Limonium spp.)

Plantes litorals amb una base de fulles en terra i llargues tiges fines que es van ramificant. Les flors són petites, disposades en fila en els extrems de les branquetes. Hi ha moltes espècies diferents.



MOSQUES BLAVES (*Ophrys speculum*)


Les flors d'aquesta orquídia apareixen en la part alta de la tija principal. Floreix tant a l'hivern com a la primavera.



ORELLA DE LLEBRE (*Caulerpa prolifera*)

Amb aspecte de planta, és una alga de color verd groguenc que viu a poca profunditat tant en la mar com en aiguamolls salobres. Creix en fons tous arribant a recobrir grans superfícies.

ESPÈCIES EXÒTIQUES FORASTERES INVASORES



CRANC DE RIU AMERICÀ

(Procambarus clarkii)

Viu en fons amb llim, però pot sortir de l'aigua i desplaçar-se llargues distàncies. Depreda petits peixos, capgrossos, insectes i també carronya.




CRANC BLAU

(Callinectes sapidus)

Pot arribar a tenir gran mida. Depreda sobretot peixos, altres crancs, amfibis i no rebutja restes d'animals.





MERCIERELLA (*Ficopomatus enigmaticus*)

Cuc tubular d'Austràlia que ha colonitzat aiguamolls de la Mediterrània i l'Atlàntic. Forma grans colònies en aigües poc profundes. Obstrueix canals, cobreix els fons i esgota l'aliment planctònic per a altres espècies.



MOIX (*Felis catus*)

Els moixos assilvestrats i els que campegen fora de les cases, depreden sobre la fauna silvestre. Accedeixen a nius d'aocells, cacen dragons i insectes, no necessàriament per a alimentar-se.



BÀLSAM

(*Carpobrotus edulis / acinaciformis*)

Coneguda planta carnososa de jardí, sud-africana. Planta reptant de creixement ràpid, s'adapta molt bé a sòls pobres, formant catifes que desplacen la vegetació autòctona.



GRAM

(*Cynodon dactylon*)

Planta entapissant, originària del nord d'Àfrica i una part d'Europa. Als jardins no resulta problemàtica, es torna invasora en assilvestrar-se a partir de restes de poda abocats il·legalment.



SEMPREVERD


(Myoporum sp)

Bardissa en jardins i carreteres. Creix ràpidament en gairebé qualsevol sòl i es manté verd tot l'any. És invasora en créixer en torrents, zones humides i terrenys oberts. Originària d'Austràlia.

FIGUERA DE MORO

(Opuntia ficus indica)

Originària de Mèxic, molt estesa a Balears. De gran port, formada per pales espinoses. De flors grans, i fruit comestible, la figa de moro. S'estén al medi ocupant vegetació autòctona.





Edició i textos: Carlota Viada (WWF)

Textos de les espècies i il·lustracions: Xavier Canyelles

Revisió: Teresa Gil (WWF) i Pere Ferriol (Universitat de les Illes Balears)

Coordinació: Amalia Maroto (WWF)

Maquetació: Marta Munguía

© Text: 2025, WWF España

© 1986 Logotip del Panda de WWF-World Wide Fund for Nature
(Inicialment World Wildlife Fund)

© “WWF” és Marca Registrada de WWF. WWF España, Gran Vía de
San Francisco 8-D, 28005 Madrid. Tel.: 91 354 0578.

Email: info@wwf.es

wwf.es/restauralcudia



Ajuntament
d'Alcúdia



Universitat
de les Illes Balears



RESTAURALCÚDIA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fundación Biodiversidad



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU